


OBSERVATIONS SUR LA MIGRATION PRINTEMPIÈRE DES OISEAUX AU CAP CORSE



1981

ASSOCIATION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA CORSE

OBSERVATIONS SUR LA MIGRATION PRINTANIERE

DES OISEAUX AU CAP CORSE

Avril et mai 1981.

BASTIA, le 4 août 1981.

ASSOCIATION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DE CORSE

Ce rapport fait suite aux observations réalisées à Barcaggio (Haute Corse) des migrateurs printaniers du 1er au 10 avril puis les 24 et 25 avril et les 8, 9, 10, 14 mai et du 23 au 28 mai.

Rappelons que le Club ornithologique de l'Association des Amis du Parc effectue chaque printemps, depuis 1979, un séjour d'étude sur la migration des oiseaux au Cap Corse.

Les observations ont toutes été faites dans la vallée de Barcaggio et sur les crêtes qui l'entourent.

Pas d'espèces nouvelles pour la Corse bien qu'il a été observé un Faucon lanier et un Aigle pomarin malheureusement ces observations sont trop peu sûres.

Par contre l'observation de certaines espèces confirme leur migration régulière comme la Bécassine double, la Marouette ponctuée, la Gorge bleue, le Traquet oreillard, la Mésange rémiz.

Aussi, nous avons noté des espèces qui jusqu'alors n'avaient point été observées à Barcaggio telles que la Glaré à collier, le Rollier d'Europe, la Fauvette babillarde et le Bruant fou.

Du 1er au 10 avril, nous avons pu capturer 253 oiseaux par pose de filets de 7 espèces différentes, dont 174 furent bagués (voir Tab. 2).

Les observations ont été faites par les membres de l'Association des Amis du Parc. Nous remercions les personnes venues du continent pour nous aider lors du séjour.

Liste des participants :

M. et D. BRUNSTEIN-ALBERTINI ; F. BOUVET ; N. CRISPINI ;
A. DESBROSSE ; R. DESBROSSES ; G.-F. FRISONI ; M.-C. GALETTI ; I. GUYOT ;
X. LAMBERT ; D. MIEGE ; O. PATRIMONIO ; T. ROSSI ; J. SIGMALT ; J.-C. THIBAUT ;
C. VERHEYDEN ; S. VOISIN ; J.-M. VUILLAMIER.

Rédaction du rapport :

D. BRUNSTEIN-ALBERTINI

Dessin de couverture :

A. SOREAU.

Dessins :

F. DESBORDES (Hirondelle de cheminée, Bergeronnette printanière - forme italienne - et Busard des roseaux mâle).

.../...

LISTE SYSTEMATIQUE DES OISEAUX OBSERVES

Cette liste suit celle de K.H. VOOUS (List of recent Holarctic Bird Species, 1973 et 1977, B.O.U.).

- Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis

1 individu chanteur est noté les 8 et 10 avril à la lagune.

- Puffin cendré Calonectris diomedea
- Puffin des anglais Puffinis puffinus
- Fou de bassan Sula sula

1 individu adulte est observé le 6 avril posé sur la mer au sud de la Giraglia.

- Cormoran huppé Phalacrocorax aristotelis
- Butor blongios Ixobrychus minutus

Noté à plusieurs reprises. Le 4 avril (1 imm. à la lagune, le 10 avril un mâle adulte est capturé et 1 sub-adulte mâle est observé. Enfin le mâle adulte est contrôlé le lendemain.

- Héron bihoreau Nycticorax nycticorax

Observé régulièrement début avril. Les oiseaux se montrent à la tombée du jour vers 19 H. 30 en criant et tournant au-dessus de la vallée pour se diriger vers le nord. Le maximum d'individus observés est de 16 ind. le 6 avril.

- Héron crabier Ardeola ralloides

1 imm. est observé le 23 mai et 1 ind. est noté les 25, 26, 27 et 28 mai.

- Aigrette garzette Egretta garzetta

Régulière les années précédentes, elle n'a été notée que deux fois, le 3 avril où 1 ind. survole la lagune et le 27 mai 1 ind. à la lagune.

- Héron cendré Ardea cinerea

Migrateur régulier observé quotidiennement par petits groupes allant jusqu'à 6 ind. (4 avril).

- Héron pourpre Ardea purpurea

Noté tout au long du séjour mais en novembre limité. 1 ou 2 ind. séjournant d'une façon plus ou moins régulière. En mai 1 ind. est observé du 25 au 28.

- Cigogne blanche Ciconia ciconia

3 passages sont notés, les oiseaux paraissant rester la nuit dans la vallée. 4 ind. arrivent le soir du 3 avril et repartent le 4 au matin. 3 ind. partent le 5 au matin. Enfin 3 ind. arrivent vers 19 H. le 8 avril.

- Harle huppé Mergus serrator

2 femelles de cette espèce sont notées les 1er et 2 avril devant la plage puis une femelle les 4 et 7 avril.

- Sarcelle d'été Anas querquedula

4 ind. sont notés le 2 avril et 2 femelles sont observées quotidiennement du 3 au 7 avril au marais.

- Fuligule morillon Aythia fuligula

1 mâle immature est noté du 2 au 4 avril, puis 1 femelle du 5 au 7 avril.

- Bondrée apivore Pernis apivorus

Observée en nombre très limité début avril : 1 ind. le 4, 4 ind. le 8, 2 ind. le 9, 10 ind. le 10. On relève aussi un passage de 55 ind. à la tour d'Aguello.

- Milan noir Milvus migravis

Régulier mais en nombre assez limité : 1 ind. le 1er avril, 2 ind. le 2, 1 le 4, 2 ind. le 5, 1 ind. les 6 et 7, 3 le 8, 5 le 9 et 2 ind. le 10 avril. Notons une observation tardive : 1 ind. le 14 mai.

- Milan royal Milvus milvus

- Busard des roseaux Circus aeruginosus


C'est le rapace diurne le plus observé au mois d'avril. Le passage le plus fort est noté le 1er avril avec 50 exemplaires. Une dizaine d'ind. est vue quotidiennement du 2 au 10 avril, un passage de 22 ind. est noté le 26 avril. Tandis qu'en mai, il n'est noté plus qu'1 imm. le 8, 1 imm. et une femelle le 10.

- Busard St. Martin Circus cyaneus

1 mâle est noté le 5 avril, 1 femelle le 26 et deux observations très tardives 1 femelle le 6 mai et une autre le 25 mai.

- Busard cendré Circus pygargus

1 mâle immature est noté le 3 avril au-dessus du champ, puis part en migration ; un autre mâle imm. le 5 avril et 1 mâle adulte le 7 avril.



F. Desbordes. Pl

- Busard indéterminé Circus sp

2 oiseaux pouvant être des busards pâles (cf : CRAMP. SIMMONS 1980. Vol II) sont notés. Le premier observé les 1er, 2 et 3 avril avait un croissant noir sur la joue, et un collier noir bien marqué, l'autre possédait un net croupion blanc, ce même croissant et un semi-collier sur la nuque et il est noté le 3 avril. Le 4 un busard indéterminé est vu à la lagune.

- Autour des palombes Accipiter gentilis

2 ind. sont observés 1 le 6 avril (Hameau de Poggio), 1 ind. le 10 avril (Chapelle de San Antonio). La nidification de cette espèce semble peu probable bien que quelques endroits favorables existent dans le Cap.

- Epervier d'Europe Accipiter nisus

1 ind. est noté le 1er avril à Horsiglia. Une femelle est vue le 9 au soir. La nidification de cette espèce dans le Cap Corse est fort probable.

- Aigle indéterminé Aquila sp

1 ind. adulte criard ou pomarin est noté le 10 avril dans la vallée.
Dessous: uni sans aucun signe particulier, plumage brun sombre, rémiges bien écartées.
Dessus : uniforme sous croupion blanc et poignets d'un brun plus clair.
Queue mi-longue. Triangulaire et uniforme quand elle est étalée et de même couleur que le plumage. La cire du bec est jaune. Plus petit qu'un aigle royal mais plus grand qu'un balbuzard. L'oiseau après avoir tourné au-dessus du marais rejoint le Nord Ouest du Cap Corse.

- Aigle botté Hieraaetus perinatus

1 ind. phase claire est noté le 7 avril. Il s'agit de la deuxième mention pour la Corse.

- Busevariable Buteo buteo

Quelques migratrices partant en mer sont notées. (1 ind. le 1er avril et 1 ind. le 5), mais la plupart des oiseaux observés sont probablement des individus locaux pouvant nicher sur les crêtes environnantes (3 ind. paradant le 5 avril, 4 ind. le 7, 3 ind. le 8, 2 ind. le 9).

- Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus

Cet oiseau a plusieurs fois été observé lors du séjour sans qu'on l'ai vu émigrer. Par ailleurs un couple a tenté de nicher non loin à l'Ouest et il est fort possible que ce soit les mêmes individus (1 ind. le 2, 3 et 9 avril, 2 ind. le 8 mai).

- Faucon crécerelle Falco tinnunculus

- Faucon crécerellette Falco naumanni

Les premiers migrateurs sont notés début avril. 5 ind. dont 2 femelles le 8 avril, 3 femelles le 9 et 1 ind. le 26 avril à Stanti (commune de Centuri). Ces oiseaux chassaient de gros insectes à la cime des arbustes de la chênaie (crête Ouest de Barcaggio).

- Faucon kobez Falco vespertinus

Une femelle est observée en migration le 26 avril.

- Faucon indéterminé Falco sp

La description pourrait correspondre à celle d'un faucon lanier. Une observation d'un grand faucon de teinte générale brune dessus et clair dessous, avec les rémiges primaires nettement plus sombre, la tête n'est pas striée ne portant pas de moustaches marquées, seule apparaît une lame sombre barrant la joue discernable quand l'oiseau est bien exposé. Vol battu avec de longs planés. L'observation effectuée sur la crête Est le 7 avril ne peut être prise en considération.

- Faucon pèlerin Falco peregrinus

Une aire fréquentée non loin de Barcaggio est découverte le 11 avril.

- Faucon hobereau Falco subbuteo

1 mâle est noté le 25 avril dans la vallée de Granaggiolo.

- Perdrix rouge Alectoris rufa

Observée régulièrement dès début avril.

- Caille des blés Coturnix coturnix

1 ind. est entendu à la lagune le 10 avril.

- Faisan de chasse Phasianus colchidus

Une femelle est vue les 4 et 9 avril.

- Marouette indéterminée Porzana sp

Des marouettes indéterminées sont notées régulièrement. (1 ind. le 3 avril, les 5, 6 et 9 avril).

- Marouette ponctuée Porzana porzana

Un ind. est observé les 4, 5 et 6 avril au marais et à la lagune. 1 ind. est capturé le 4 avril au marais.

- Vanneau huppé Vanellus vanellus

1 ind. est noté les 6, 8 et 9 avril à la lagune.

-Râle d'eau Rallus aquaticus

2 avril, 1 ind. est entendu à la lagune.

- Poule d'eau Gallinula chloropus

Il est fort probable que cette espèce niche à la lagune bien qu'un certain nombre des oiseaux observés soit des migrateurs. L'espèce est observée quotidiennement : 1 à 6 ind.

- Glaréole à collier Glareola pratincola

1 ind. est observé sur la plage le 26 avril.

- Pluvier indéterminé Pluvialis sp

Un pluvier est noté en migration au-dessus de la mer le 3 avril.

- Huîtrier-pie Haemantopus ostrelagus

Espèce observée seulement à partir de mai. 1 ind. les 8, 9 et 14 mai sur la plage.

- Oedicnème criard Burhinus oedicephalus

1 ind. est noté sur les dunes le 4 avril.

- Petit gravelot Charadrius dudius

Cet oiseau est observé tout au long du séjour (du 1er au 11 avril) bien qu'en nombre assez limité allant de 1 à 6 exemplaires.

- Grand gravelot Charadrius biaticula

Il est observé en petit nombre sur la plage et sur la lagune à partir de fin avril, début mai (5 ind. le 26 avril, 1 ind. les 8, 9 mai, 5 ind. le 10, 2 ind. le 14).

- Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus

1 ind. est observé le 4 avril, les 8 et 9 avril et le 14 mai.

- Bécasseau sanderling Calidris alba

Noté à partir de fin avril par unité sur la plage. 1 ind. les 25 et 26 avril et 3 ind. le 9 mai, 2 ind. le 10.

- Bécasseau minute Calidris minuta

Cette espèce est notée quotidiennement du 1er au 11 avril en nombre limité, allant de 1 à 10 ind. environ. Il est aussi noté en mai, 2 ind. les 26 et 27.

.../...

- Combattant Philomachus pugnax

Ce migrateur a peu été observé cette année. 1 ind. le 2 avril, 3 ind. le 3, 1 mâle en plumage nuptial le 8 et 1 ind. le 27 mai.

- Bécassine des marais Gallinago gallinago

1 à 15 ind. sont observé quotidiennement. 2 ind. sont capturés et bagués le 4 avril. Quelques exemplaires sont notés en migration.

- Bécassine double Gallinago media

1 ind. est capturé le 8 avril.

- Bécassine sourde Lymnocyptes minimus

Il s'agit de la première mention de cette espèce à Barcaggio. 1 ind. est noté au champ le 7 avril.

- Courlis cendré Numenius arquata

1 ind. est noté le 8 mai.

- Courlis corlieu Numenius phaeopus

1 ind. est observé sur la plage les 25 et 26 avril.

- Chevalier arlequin Tringa erythropus

Les premiers individus sont notés le 10 avril (2 ind.) et 1 ind. en plumage nuptial est vu les 8, 9, 10 et 14 mai.

- Chevalier cul blanc Tringa ochropus

5 ind. le 2 avril, 2 ind. le 3, 1 ind. séjourne à la lagune et au marais du 5 au 10 avril. 1 ind. est noté le 8 mai.

- Chevalier sylvain Tringa glareola

Cette espèce est observée dès début avril, bien qu'en nombre limité. 1 ind. est attrapé à la main le 9 mai (vent de secteur S.E. très violent).

- Chevalier aboyeur Tringa nebularia

1 ind. est noté les 25 et 26 mai.

- Chevalier guignette Actitis hypoleucos

Cette espèce est observée début avril en nombre limité mais ses effectifs augmentent fin avril et début mai. 1 ind. les 9 et 10 avril, 20 ind. le 8 mai et 1 ind. le 27 mai.

- Chevalier guignette Actitis hypoleucos

Cette espèce est observée début avril en nombre limité mais ses effectifs augmentent fin avril et début mai. 1 ind. les 9 et 10 avril, 20 ind. le 8 mai et 1 ind. le 27 mai.

- Mouette rieuse Larus ridibundus

1 immature est observé les 5 et 9 avril au-dessus de la mer et le 8 avril 1 imm. est noté posé sur le champ.

- Goéland d'Audouin Larus audouini

- Goéland leucophaé Larus cachinnans

- Sterne hansel Gelochelidon nibtica

1 ind. se dirigeant vers Capraia est observé le 4 avril.

- Pigeon ramier Columba palumbus

Cet oiseau est observé début avril en petit nombre ; toutefois deux vols allant vers l'Ouest le 5 avril comptaient, l'un 50 ind. et l'autre 60 ind. environ.

- Pigeon biset Columba livia

1 couple est observé le 10 et le 26 avril à la tour, où il est fort possible qu'il niche.

- Tourterelle des bois Streptopelia turtur

Le premier individu est noté le 6 avril ; ensuite, seulement observé fin avril, 10 ind. le 25 avril, 4 le 26, 30 ind. le 8 mai, 5 ind. le 10, 10 ind. le 14 mai. Un fort passage est observé du 25 au 28 mai.

- Chouette effraie Tyto alba

- Hibou petit duc Otus scops

Notés dès notre arrivée ; un chanteur est entendu régulièrement début avril. 4 ind. sont capturés.

- Coucou gris Cuculus canorus

Observé par unité les 10, 26 avril et 8 mai, un passage de quelques dizaines est relevé les 9 et 10 mai, 1 ind. le 14 mai.

- Martinet noir Apus apus

Les premiers sujets sont notés par unité les 1er et 2 avril. Puis un passage de quelques dizaines est observé les 7 et 8 avril ; le 9 un seul ind. est noté. Enfin, quelques individus passent les 25, 26 avril et 8 mai.

- Martinet à ventre blanc Apus melba

Cette espèce est vue à trois reprises en nombre très limité, 3 ind. le 5 avril, 1 ind. le 8, quelques ind. le 14 mai et enfin 2 ind. le 26 mai.

- Guêpier d'Europe Merops apiaster

2 ind. le 4 avril, des passages de 5 à 30 ind. sont vus les 8, 9, 26 avril et les 8 et 14 mai.

- Rollier d'Europe Coracias garrulus

2 ind. sont observés à Tollare le 23 mai.

- Huppe fasciée Upupa epops

Cette espèce est notée dès le 15 mars (des sujets ont déjà été notés en hivernage) puis elle est observée quotidiennement en nombre limité, 1 dizaine d'ind. sont vus tout au long d'avril alors que seulement 1 ind. est observé les 10 et 14 mai. Ces observations confirment la présence de migrants.

- Torcol Jynx torquilla

Observé le 9 avril (1 ind.). Une capture est effectuée le 5 avril.

- Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla

Notée dès le 2 avril cette alouette est vue quotidiennement par unité début avril. Toutefois un passage diffus d'une centaine d'exemplaires se dirigeant vers l'Ouest est observé le 6 avril.

- Alouette lulu Lullula arborea

- Alouette des champs Alauda arvensis

Cette espèce est observée dès le 15 février (2 ind.) et, est notée quotidiennement tout au long du mois d'avril par groupes de quelques dizaines (allant jusqu'à 70 ind. environ).

- Hirondelle de rivage Riparia riparia

Cette hirondelle est notée en avril et en mai en migration peu importante (le plus souvent quelques dizaines d'ind.), sauf les 6, 7 et 26 avril, où la migration atteignait quelques centaines d'ind. 14 ind. ont été capturés.

- Hirondelle de cheminée Hirundo rustica

Notée en avril et en mai, les passages ont été assez peu importants malgré les migrations de quelques milliers des 5, 6, 7, 26 avril et 14 mai. Le plus souvent le passage était diffus (jusqu'à quelques centaines) avec quelques dizaines d'individus chassant et stationnant la nuit dans la vallée. Les forts passages se sont effectués par vents faibles de secteurs de NE et NW 129 oiseaux ont été bagués.



F. Desbordes. 81

- Hironde rouseline Hirundo laurica

Cette espèce est observée à deux reprises, le 5 avril 5 ind. dans le haut de la vallée, le 10 avril, 3 ind. à la crête Est de Barcaggio et 1 ind. à la chapelle de San Antonino.

- Hironde de rochers Ptyoprogne rupestris

- Hironde de fenêtre Delichon urbica

Notée en nombre restreint tout au long des mois d'avril et de mai, les forts passages se sont faits les 6, 7, 9 avril et 14 mai (quelques centaines d'ind.).

- Pipit rouseline Anthus campestris

2 ind. sont notés dès le 3 avril puis les 4, 8 et 10 avril, quelques sujets sont vus le 14 mai.

- Pipit des arbres Anthus trivialis

Noté en avril seulement mais quotidiennement. Notons 2 passages de quelques dizaines les 3, 4 et 8 avril.

- Pipit farlouse Anthus pratensis

Cet oiseau est observé en petit nombre début avril seulement, avec deux passages de quelques dizaines les 6 et 8 avril.

- Pipit spioncelle Anthus spinoletta

Il est noté tout au long du mois d'avril par unité (10 ind. maximum) sauf le 3 avril où un passage de 70 ind. environ est observé sur la plage.

- Bergeronnette printanière Motacilla flava


Migrateur régulier et abondant, cet oiseau est noté régulièrement les mois d'avril et de mai avec de forts passages allant jusqu'au millier les 5, 7, 8 avril. Les deux sous espèces les mieux représentées sont M.f. flava et la M.f. cinereo capille. Les formes M.f. thunbergi et M.f. iberiae sont moins bien représentées. Un ind. de la forme M.f. feldegg est observé les 5 avril et 8 mai. 6 ind. ont été capturés.

- Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea

1 ind. est noté le 5 avril.

- Bergeronnette grise Motacilla alba

Observée en nombre limité (1 à 10 ind.) tout au long du mois d'avril.



F. Desbordes . 81

- Troglodyte Troglodytes troglodytes
- Accenteur mouchet Prunella modularis
- Rouge-gorge Erithacus rubecula

Notés quotidiennement début avril, la plupart des oiseaux sont migrateurs malgré une recapture d'un oiseau bagué six jours auparavant (toutes les autres recaptures étant des ind. bagués la veille). Nous avons pu noter de fortes différences d'effectifs, un fort passage les 2, 3 et 4 avril (quelques centaines) se réduisant à quelques individus les 5, 6 et 7 avril. 25 ind. ont été bagués.

- Rossignol pholomèle Luscinia megarhynchos

Observés à partir du 4 avril en nombre assez limité (1 à 10 ind.) Ces oiseaux, comme nous l'avions remarqué l'an passé, sont pour la plupart migrateurs.

- Gorge-bleue à miroir Luscinia svecica

Un mâle à miroir blanc est vu au champs le 3 avril.

- Rouge-queue noir Phoenicurus ochruros

Cet oiseau est noté en nombre très limité et seulement début avril, 3 ind. le 15 mars, 2 ind. le 1er avril, 3 mâles le 3, 1 mâle les 4 et 5.

- Rouge-queue à front blanc Phoenicurus phoenicurus

Observé quotidiennement en nombre limité, du 1er au 11 avril, observé les 8 et 10 mai (1 ind.) et un petit passage le 14 mai. 3 ind. ont été capturés.

- Traquet tarier Saxicola rubetra

Noté en avril et en mai en nombre très limité, mais régulier dès le 2 avril, 1 ind. est encore observé le 14 mai.

- Traquet pâtre Saxicola torquata

- Traquet motteux Oenanthe oenanthe

Observé quotidiennement du 1er au 10 avril, cette espèce est notée le 25 avril (10 ind.), le 26 avril (6 ind.), le 8 mai (30 ind.), le 10 mai (6 ind.) et le 14 mai (1 mâle et 2 femelles).

- Traquet oreillard Oenanthe hispanica

Noté régulièrement début avril, tous les ind. observés étaient de la phase stapazin sauf 1 mâle de la phase oreillard observé le 4 avril (1 ind. les 2, 3 avril, 2 ind. le 4, 1 ind. le 5, 2 ind. le 6, 1 ind. les 8 avril et 14 mai).

- Merle bleu Monticola solitarius

- Merle à plastron Turdus torquatus

1 ind. mâle de la forme nominale est noté le 2 avril dans les dunes.

- Merle noir Turdus merula

- Grive musicienne Turdus philomelos

Quelques ind. sont encore observés début avril. 1 ind. est capturé et bagué le 2 avril.

- Bouscarle de Cetti Cettia cetti

1 ind. est noté le 6 avril.

- Cisticole des joncs Cisticola jundicis

Un chanteur est entendu les 2, 3 et 4 avril. 2 ind. le 5, 1 ind. les 8 et 9, 2 ind. le 10 avril. Il n'est pas exclus que ces sujets soient des nicheurs.

- Locustelle indéterminée Locustella sp.

1 ind. chantant est entendu le 7 avril.

- Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus

Quelques ind. sont notes les 2 et 3 avril et 1 ind. est noté les 4, 6 et 10 avril. 3 ind. ont été bagués.

- Rousserole turdoïde Acrocephalus arundinaceus

1 ind. est observé le 26 avril.

- Hypolaïs indéterminé Hippolaïs sp.

1 ind. est observé le 9 avril.

- Fauvette sarde Sylvia sarda

- Fauvette pitchou Sylvia undata

- Fauvette passerinette Sylvia cantillans

Les premières sont observées le 6 avril, puis elle sont quotidiennement notées début avril. Nous n'avons pu déterminer si ces sujets sont de passage ou font partie de la population locale. 1 ind. est capturé le 4 avril.

- Fauvette melanocéphale Sylvia melanocephala

- Fauvette grisette Sylvia communis

Notée dès le 2 avril; quelques ind. sont observés ensuite, les 5, 6, 7, 9 et 10 avril. 1 ind. est capturé.

- Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla

Observée quotidiennement début avril. 10 ind. ont été capturés bien que le nombre de migrateurs était peu élevé, exception faite du 5 avril où le passage était plus intense.

- Fauvette babillarde Sylvia curruca

De passage rare en Corse 1 ind. est noté à la lagune le 8 avril.

- Pouillot/Indéterminée Phylloscopus spp.

De nombreux pouillots indéterminés sont observés les 5, 6 et 10 avril.

- Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix

Observé seulement à deux reprises. 2 ind. le 8 avril, et quelques ind. le 10. 2 ind. sont capturés.

- Pouillot vélou Phylloscopus collybita

Noté quotidiennement du 1er au 10 avril en nombre assez limité, sauf le 6 avril, jour où le passage s'est fortement accru. A noter que le 7 avril, un seul ind. est observé, 4 ind. sont capturés.

- Pouillot fitis Phylloscopus trochilus

Les premiers sont notés le 6 avril et les oiseaux sont observés le 7, 8, 9 et 10 avril. 3 ind. ont été capturés.

- Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapillus

1 ind. est noté le 9 avril.

- Gobe-mouche gris Muscicapa striata

Observé à partir de fin avril un passage d'une dizaine d'ind. est noté les 25, 26 avril.

- Gobe-mouche noir Ficedula hypoleuca

Les premiers sont observés le 2 avril (2 ind.) puis 2 mâles le 8 avril, 2 femelles et 3 mâles le 10 avril et nombreux les 25 et 26 avril.

- Mésange à longue queue Aegithalos caudatus

- Mésange bleue Parus caeruleus

- Mésange charbonnière Parus major

- Mésange remiz Remiz pendulinus

10 ind. adultes sont observés le 6 avril en migration à la lagune.

- Tichodrome échelette Tichodroma inuraria

1 ind. est noté dans les falaises de la tour d'Agnello les 4, 7 et 8 avril.

- Lorient d'Europe Oriolus oriolus

Vu à 3 reprises : 1 ind. le 26 avril, 1 mâle le 8 mai, 2 mâles le 10 mai.

- Pie-grièche écorcheur Lanius collurio

Observé seulement à partir de mai, 2 mâles le 8 mai, 1 couple le 14 et 3 ind. le 23 mai.

- Pie-grièche à tête rousse Lanius senator

Notée en nombre restreint. Les premières le sont le 3 avril (2 ind. dont 1 de la forme nominale et l'autre de la forme L.s. badius). Par la suite il n'est observé que des ind. de la forme nominale à l'exception du 26 avril où un sujet appartient à la forme insulaire.

- Geai des chênes Garrulus glandarius

- Corneille mantelée Corvus corone

- Grand corbeau Corvus corax

- Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris

Un petit passage de 15 ind. est noté le 2 avril puis 1 à 5 ind. sont observés régulièrement du 3 au 8 avril.

- Etourneau unicolore Sturnus unicolor

1 ind. est observé le 10 avril.

- Moineau domestique Passer domesticus

- Moine soulcie Petronia petronia

- Pinson des arbres Fringilla coelebs

- Venturan montagnard Serinus citrinella

- Verdier Carduelis chloris

- Chardonneret Carduelis carduelis

- Tarin des aulnes Carduelis spinus

1 dizaine d'ind. est noté dans les aulnes près du camp les 7, 8 et 9 avril.

- Linotte mélodieuse Carduelis cannabina

Cette espèce est notée en nombre limité tout au long du séjour, sauf le 6 avril où un important passage de 150 ind. environ est observé.

- Bruant fou Emberiza cia
- Bruant zizi Emberiza cirlus
- Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus

1 femelle est observée au marais les 7 et 8 avril.

- Bruant proyer Hiliaria calandra

DATES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL DES OISEAUX
SECTEUR DU VENT	ES.E.	S.E.	E.S.E.	E	W	W	S.E.	S.E.	S.E.	N.E.	
ESPECES											
Bondrée				1				4	2	10	17
Milan noir	1	2		1	2	1	1	3	5	2	18
Busard des roseaux	50	9	9	3		4	7	14	12	8	115
Busard cendré			1		1		1				3

TABLEAU I. : REGIME DES VENTS EN AVRIL 1981 A BARCAGGIO.

	1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	T O
<i>Ixobrychus minutus</i> :										1	R	1
<i>Porzana porzana</i> :				1								1
<u><i>Gallinago gallinago</i></u> :					2							2
<i>Gallinago media</i> :								1				1
<i>Otus scops</i> :	1			1								1
<i>Jynx torquilla</i> :					1							1
<i>Riparia riparia</i> :		1			3	1	2	5			1	14
<u><i>Hirundo rustica</i></u> :	2	35.2 R	11	5	10	31	13	1		19	2	129
<i>Anthus spinoletta</i> :					1							1
<i>Actacilla fava</i> :	1					3		1				5
<i>Troglodytes troglodytes</i> :		1	2		2							5
<i>Prunella modularis</i> :		1	1				1					4
<u><i>Erethacus rubecula</i></u> :	2	10	5 + 1 R	3	2 + 2 R	3			R			25
<i>Luscinia megarhynchos</i> :								2			1	4
<i>Phoenicurus phoenicurus</i> :			1									5
<i>Saxicola torquata</i> :			1									1
<u><i>Turdus philomelos</i></u> :		1						1				1
<u><i>Arcophthalmus schoenobaenus</i></u> :		2		1 R	1						1 R	3
<i>Sylvia cantillans</i> :					1							1
<i>Sylvia melanocephala</i> :						1						1

