

J. Piccini

# OISEAUX D'EAU

# HIVERNANT

1980

1981

# EN CORSE



**ASSOCIATION DES AMIS DU PARC NATUREL RÉGIONAL  
DE LA CORSE**

OISEAUX D'EAU HIVERNANT EN CORSE

1980 - 1981

Rédaction du rapport : J.-M. VUILLAMIER

Dessin de couverture : Dominique CORTEGGIANI

Participants aux observations : F. BOUVET, D. et M. BRUNSTEIN, M.-C. GALETTI,  
I. GUYOT, C. PIETRI, T. ROSSI, T. STEURI, J.-C. THIBAUT, M. VERHEYDEN,  
J.-M. VUILLAMIER.

BASTIA, LE 27 JUILLET 1981



ASSOCIATION DES AMIS DU PARC NATUREL REGIONAL DE CORSE

L'hiver 1980-1981 a été marqué par une certaine rigueur. Plusieurs vagues de froid ont atteint la Corse en décembre, janvier et février.

Bien qu'elles n'aient pas été très rigoureuses, on relève l'observation et le stationnement d'espèces généralement rares en Méditerranée comme l'Eider à Duvet, le Harle piette, le Fuligule milouinan, le Plongeon arctique et même de deux espèces n'ayant jamais été notées en Corse auparavant, le Harle bièvre et la Macreuse noire.

Cet hiver encore, les membres de notre Association ont pu constater de nombreux délits de chasse sur les étangs littoraux, en particulier des actes de braconnage depuis des embarquations à moteur. On ne peut que regretter l'absence d'une véritable politique de la part des autorités cynégétiques en matière de gibier d'eau.

.../...

ESPECES OBSERVEES

<u>Gavia arctica</u>	Plongeon arctique
<u>Podiceps ruficollis</u>	Grèbe castagneux
<u>Podiceps cristatus</u>	Grèbe huppé
<u>Podiceps nigricollis</u>	Grèbe à cou noir
<u>Phalacrocorax carbo</u>	Grand cormoran
<u>Anas penelope</u>	Canard siffleur
<u>Anas strepera</u>	Canard chipeau
<u>Anas crecca</u>	Sarcelle d'hiver
<u>Anas platyrhynchos</u>	Canard colvert
<u>Anas acuta</u>	Canard pilet
<u>Anas querquedula</u>	Sarcelle d'été
<u>Anas clypeata</u>	Canard souchet
<u>Aythya ferina</u>	Fuligule milouin
<u>Aythya fuligula</u>	Fuligule morillon
<u>Aythya marila</u>	Fuligule Milouinan
<u>Somateria mollissima</u>	Eider à duvet
<u>Melanitta nigra</u>	Macreuse noire
<u>Bucephala clangula</u>	Garrot à oeil d'or
<u>Mergus albellus</u>	Harle piette
<u>Mergus serrator</u>	Harle huppé
<u>Mergus merganser</u>	Harle bievre
<u>Fulica atra</u>	Foulque macroule

### Plongeon arctique

Rarement noté en Corse, il a été observé en novembre (1 le 7 et 11 à Diana), en décembre (1 le 2 à Diana et 4 le même jour à Urbino) et en mars (1 le 22 à Urbino).

### Grèbe castagneux

Observé en janvier dans deux localités seulement : Diana (2 ind) et Biguglia (20 ind).

### Grèbe huppé

Observé à Diana, Urbino, Biguglia et dans le port d'Ajaccio où un sujet a stationné tout l'hiver. Le maximum d'individus observés en janvier était de 115 à Diana et de 4 à Biguglia.

### Grèbe à cou noir

Observé à Urbino, Gradugine 20 ind en décembre et dans la baie de Porto Vecchio 1 ind le 5 décembre. Seul l'étang d'Urbino a abrité un groupe d'hivernant (12-30 ind) de début décembre à début mars.

### Grand cormoran

Espèce dont les effectifs sont en progression régulière depuis quelques années. En janvier, on relevait sa présence à Diana (300 ind), Biguglia (7 ind) et Urbino (18 ind). Le déséquilibre numérique d'Urbino en faveur de Diana est lié à la pression de chasse sur le pourtour de l'étang le jour du comptage.

### Grand siffleur

Observé à Lumio (1 ind en novembre), Palo (5 ind en décembre), à Diana, à Urbino (3 ind en février) et à Biguglia. Le maximum d'individus observés en janvier était de 176 (83♂ et 93♀) à Diana et de 60 (30♂ et 30♀) à Biguglia.

### Canard chipeau

Observé en nombre très limité. On relève sa présence à Diana (6 le 2 décembre, 5 le 14 décembre et 7 le 28 janvier) et à Palo (3 le 6 décembre).

### Sarcelle d'hiver

Notée en nombre limité en novembre à Biguglia (5 ind) et à Urbino en décembre (12 ind). Le seul point d'hivernage régulier étant dans la Réserve Nationale de Chasse de Casabianda (60 ind en janvier).

Canard colvert

Les effectifs hivernant en Corse sont extrêmement faibles, compte tenu des capacités d'accueil de l'Ile. En relève la présence de 5 individus à Urbino et de 10 à Palo en décembre. En janvier on note 63 ind à Casabianda et seulement 4 à Biguglia.

Canard pilet

Le passage d'automne a été décelé en nombre très limité en septembre et octobre en Balagne ; l'hivernage extrêmement faible cette année fut relevé en janvier à Diana 20 ind et à Casabianda (15 ind).

Sarcelle d'été

Premier individu noté le 17 février à Urbino et le 18 à Gradugine. Passage relativement important cette année en mars et avril. Des bandes de quelques dizaines d'individus sont observées à Biguglia et en mer dans les grandes baies de la côte occidentale.

Canard souchet

Noté seulement en décembre à Diana (16 ind) et Palo (4 ind).

Fuligule milouin

	<u>Décembre</u>	<u>Janvier</u>	<u>Février</u>
Gradugine	15		
Palo	26		
Diana	100		
Urbino	4		100
Biguglia	pas de comptage	4.280	pas de comptage

Sa présence fut relevée dans 5 localités. Les effectifs hivernant à Biguglia représentent seulement la moitié de ceux de l'année passée et de l'effectif moyen noté les années précédentes (voir Hemery et al. 1979 Bulletin Mensuel O.N.C.).

Fuligule morillon

Noté en nombre inférieur à la dizaine à Palo et Diana (décembre). Avec 6.370 individus en janvier, Biguglia accueillait une population plus importante que l'année passée et que celle de l'effectif moyen (voir Hemery et al. 1979 Bulletin Mensuel O.N.C.). Comme pour l'espèce précédente, il faut attendre les résultats de l'enquête nationale pour tenter d'expliquer ce phénomène.

Fuligule milouinan

Espèce dont la présence en Corse est tout à fait exceptionnelle. Un couple est observé le 22 mars à l'étang d'Urbino.

Eider à duvet

Espèce dont la présence en Corse n'avait été signalée qu'une seule fois auparavant. Un mâle immature et deux femelles sont observés le 11 janvier près de Lumio. Le mâle stationne jusqu'au 15 mars. Un mâle est aussi noté le 15 avril au Cap Corse.

Macreuse noire

N'avait jamais été déterminée en Corse auparavant. L'espèce a été notée du mois de décembre au mois de mars à Urbino. 1 individu le 2 et le 14 décembre, puis 4 individus les 17 février et 1er mars. Les oiseaux étaient en plumage immature.

Garrot à oeil d'or

Noté à l'étang d'Urbino : 2 mâles et 2 femelles le 6 décembre. 2 mâles et 3 femelles le 14 décembre. Noté aussi à Biguglia au mois de janvier 1 individu plumage immature.

Harle piette

L'espèce n'avait pas été observée depuis le siècle dernier. Une femelle ou un immature posé dans le grau de Biguglia fait l'objet de tir fourni de la part d'un chasseur le 28 novembre.

Harle huppé

Le seul point d'hivernage régulier en Corse est l'étang d'Urbino. Un à deux individus de décembre à février. Noté aussi à Biguglia 2 ind en décembre et janvier, dans la baie de Porto Vecchio 2 ind en décembre et un individu dans le port de Bastia en novembre.

Harle bièvre

Rare dans la région Méditerranéenne, l'espèce n'avait jamais été observée en Corse. Un mâle est vu à Biguglia (Fornioli) le 14 janvier.

.../...

Foulque macroule

	<u>Novembre</u>	<u>Décembre</u>	<u>Janvier</u>
Casabianda			15
biguglia			8.000
Urbino			400
Figarella	2		
Palo		500	
Gradugine		30	

La population hivernante à biguglia était inférieure à celle de l'année passée mais très voisine de celle de l'effectif moyen (voir Hemery et al. 1979 Bulletin Mensuel O.N.C.).

-----